

**ALLERGAN crema**  
**Difenidramina**

**PRIMA DELL' USO LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTE LE  
INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO**

**Questo è un medicinale di automedicazione che potete usare per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico.**

**Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurne gli effetti indesiderati.**

- **Per maggiori informazioni e consigli rivolgersi al farmacista.**
- **Consultare il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento.**

**DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE**

ALLERGAN 2g /100g crema  
Difenidramina cloridrato

**COMPOSIZIONE**

1 grammo di crema contiene:

**Principio attivo:** difenidramina cloridrato 20 mg pari a difenidramina 17,5 mg, per un totale di 600 mg di difenidramina cloridrato pari a 525 mg di difenidramina per il tubo da 30 g.

**Eccipienti:** acido stearico, glicerina, lanolina, trietanolamina, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, acqua distillata.

**COME SI PRESENTA**

ALLERGAN si presenta in forma di crema ad uso dermatologico (da spalmare sulla pelle), contenuta in un tubetto metallico. Il contenuto della confezione è di 30 g.

**CHE COSA E'**

ALLERGAN è un antipruriginoso, ovvero calma il prurito ed i fastidi derivanti da irritazioni, punture di insetti ed arrossamenti della pelle dovuti ad una eccessiva esposizione al sole.

**TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL' IMMISSIONE IN  
COMMERCIO**

IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.

VIA MARTIRI DI CEFALONIA, 2, 26900 - LODI (LO).

**PRODUTTORE E CONTROLLORE FINALE**

ALLERGAN è prodotto, confezionato, controllato e rilasciato da Alfa Wassermann, Via E. Fermi, 1 - 65020 Alanno (PE).

**PERCHE' SI USA**

ALLERGAN si usa per il trattamento sintomatico locale di dermatiti pruriginose, eritema solare, punture d'insetti (ovvero per calmare il prurito ed i fastidi derivanti da irritazioni, punture di insetti ed arrossamenti della pelle dovuti ad una eccessiva esposizione al sole).

**QUANDO NON DEVE ESSERE USATO**

Bambini al di sotto dei 2 anni.

Ipersensibilità nota verso i componenti e verso altri antiistaminici di analoga struttura chimica (dimenidrinato, carbinoxamina maleato).

Allergan crema 30 g  
FI 09/2009

1

**ALLERGAN crema**  
**Difenidramina**

E' opportuno consultare il medico, nel caso in cui tali disturbi si fossero già manifestati. Vedere anche capitolo relativo a GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO.

**QUANDO PUÒ ESSERE USATO SOLO DOPO AVER CONSULTATO IL MEDICO**

Gravidanza e allattamento ( veder "Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento").

**COSA FARE DURANTE LA GRAVIDANZA E L' ALLATTAMENTO**

Nelle donne in stato di gravidanza e durante l'allattamento il prodotto va usato solo in caso di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico.

**PRECAUZIONI PER L' USO**

Non utilizzare con bendaggio occlusivo. L'impiego del prodotto, specie se prolungato, può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione (reazione di tipo allergico), ove ciò si verifici interrompere il trattamento e consultare il medico.

**QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L'EFFETTO DEL MEDICINALE**

Non sono note incompatibilità con altri medicinali o alimenti. Se state usando altri medicinali chiedete aiuto al vostro medico o farmacista.

**E' IMPORTANTE SAPERE CHE**

ALLERGAN deve essere applicato su zone ridotte della pelle.  
ALLERGAN crema non va applicato su zone della pelle con vesciche, su piaghe vive e superfici in via di cicatrizzazione.  
Evitare il contatto con gli occhi o altre membrane mucose. Nel caso di eritema solare non esporre successivamente la pelle al sole. Se dopo un breve periodo di trattamento non si notasse alcun miglioramento o se si manifestassero eruzioni cutanee, fenomeni di irritazione e bruciori, sospendere il trattamento e rivolgersi al medico.  
ALLERGAN non ha effetti sulla capacità di guidare e sull'uso di macchine.

**COME USARE QUESTO MEDICINALE**

- *Quanto:* spalmare un sottile strato di crema sulla parte interessata 2 o 3 volte al giorno.

ATTENZIONE: NON SUPERARE LE DOSI INDICATE SENZA IL CONSIGLIO DEL MEDICO.

- *Quando e per quanto tempo:* usare solo per brevi periodi di trattamento. Consultare il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

**COSA FARE SE AVETE PRESO UNA DOSE ECCESSIVA DI MEDICINALE**

Non sono stati segnalati fenomeni avvenuti in seguito alla somministrazione eccessiva del medicinale. In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di ALLERGAN avvertite immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.

**EFFETTI INDESIDERATI**

Sono stati riscontrati bruciore, eruzioni cutanee, reazioni di fotosensibilità (comparsa di macchia sulla pelle dopo esposizione al sole).

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori. Quando si presentano è tuttavia

**ALLERGAN crema**  
**Difenidramina**

opportuno consultare il medico o il farmacista.

E' importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo.

Richiedere e compilare la scheda di segnalazione degli effetti indesiderati disponibile in farmacia.

**SCADENZA E CONSERVAZIONE**

Vedere la scadenza indicata sulla confezione. La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

**ATTENZIONE:** NON UTILIZZARE IL MEDICINALE DOPO LA DATA DI SCADENZA INDICATA SULLA CONFEZIONE.

TENERE IL MEDICINALE FUORI DALLA PORTATA E DALLA VISTA DEI BAMBINI

E' importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la scatola che il foglio illustrativo.

**Revisione del Foglio Illustrativo da parte dell'AIFA**  
Settembre 2009