

## **Foglio illustrativo: informazioni per il paziente**

### **Guaiacalcium complex 0,144 g/100 ml + 2 g/100 ml sciroppo**

dropropizina + potassio solfoguaiacolato

#### **Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo alcuni giorni.

#### **Contenuto di questo foglio:**

1. Che cos'è Guaiacalcium complex e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Guaiacalcium complex
3. Come prendere Guaiacalcium complex
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Guaiacalcium complex
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### **1. Che cos'è Guaiacalcium complex e a che cosa serve**

Guaiacalcium complex contiene dropropizina e potassio solfoguaiacolato. Questo medicinale si usa per calmare la tosse.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo alcuni giorni.

#### **2. Cosa deve sapere prima di prendere Guaiacalcium complex**

##### **Non prenda Guaiacalcium complex**

- se è allergico ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- in gravidanza, durante l'allattamento (vedere Gravidanza e allattamento);
- nei bambini al di sotto dei 13 anni d'età.

##### **Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Guaiacalcium complex

A causa della presenza di etanolo (alcol), usi particolare cautela se uno dei seguenti casi la riguardano:

- se ha malattie di fegato;
- se soffre d'epilessia;
- se ha problemi di alcolismo;
- se ha subito traumi o soffre di malattie cerebrali.

### **Bambini e adolescenti**

Questo medicinale può essere usato solo nei bambini al di sopra dei 13 anni d'età.

### **Altri medicinali e Guaiacalcium complex**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

### **Guaiacalcium complex con alcol**

L'alcool contenuto nel medicinale può modificare o aumentare l'effetto di altri farmaci.

### **Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Non prenda questo medicinale se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Questo medicinale può raramente causare sonnolenza. Non deve guidare, utilizzare macchinari complessi o svolgere qualsiasi altra attività potenzialmente pericolosa fino a quando non saprà se questo medicinale altera la sua capacità di svolgere queste attività.

### **Guaiacalcium complex contiene etanolo**

Questo medicinale contiene 6,3 vol. % di etanolo (alcol), ad es. fino a 0,76 g per dose, equivalenti a 20 ml di birra, 7,9 ml di vino per dose.

Può essere dannoso per gli alcolisti.

Da tenere in considerazione nelle donne in gravidanza o in allattamento e nei bambini (per i quali il prodotto è comunque controindicato) e nei gruppi ad alto rischio come le persone affette da patologie epatiche o epilessia.

**Per chi svolge attività sportiva**, l'uso di medicinali contenenti alcool etilico può determinare positività ai test antidoping in rapporto ai limiti di concentrazione alcolemica indicata da alcune federazioni sportive.

**Guaiacalcium complex contiene metile para-idrossibenzoato.** Può causare reazioni allergiche (anche ritardate).

**Guaiacalcium complex contiene saccarosio.** Questo medicinale contiene 6 g di saccarosio per dose. Da tenere in considerazione in persone affette da diabete mellito.

### 3. Come usare Guaiacalcium complex

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico, o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata **negli adulti e negli adolescenti oltre i 13 anni di età** è di 1 cucchiaino 2 o 3 volte al giorno.

Modo d'uso: nella stagione fredda si consiglia di prendere lo sciroppo caldo, diluendo la dose in acqua, tè o latte molto caldi.

Durata del trattamento: usare solo per brevi periodi di trattamento.

Non superare le dosi consigliate senza il consiglio del medico.

#### **Se usa più Guaiacalcium complex di quanto deve**

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di Guaiacalcium complex **avvertite immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.**

### 4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Raramente sono stati segnalati casi di nausea ed altri lievi disturbi dello stomaco e dell'intestino.

#### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sito web: <http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili>. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

### 5. Come conservare Guaiacalcium complex

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo "Scad.". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

### **Cosa contiene Guaiacalcium complex**

I principi attivi sono dropropizina e potassio solfoguaiacolato.

100 ml di sciroppo contengono:

- Principi attivi: Dropropizina 0,144 g, Potassio solfoguaiacolato 2 g.
- Gli altri componenti sono aconito radice estratto fluido, lauro ceraso (acqua distillata aromatica), grindelia estratto fluido, balsamo tolu estratto fluido, etanolo 95%, caramello naturale, estratto aromatico, saccarosio, metile paraidrossibenzoato, acqua depurata.

### **Descrizione dell'aspetto di Guaiacalcium complex e contenuto della confezione**

Guaiacalcium complex si presenta in un flacone da 200 ml in vetro scuro con tappo in alluminio.

### **Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio**

Laboratorio Farmaceutico SIT S.r.l. - Via Cavour, 70 - 27035 Mede (PV)

#### **Produttore**

Laboratorio Farmaceutico SIT S.r.l. - Via Cavour, 70 - 27035 Mede (PV)

DMS Farmaceutici S.p.A. - Via Provinciale per Lecco, 78 - 22038 Tavernerio (CO)

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il**