

## **SORBICLIS**

36,00 g/120 ml + 0,24 g/120 ml soluzione rettale  
Bambini soluzione rettale. Contenitore monodose 120 ml

## **COMPOSIZIONE**

Sorbiclis 36,00 g/120 ml + 0,24 g/120 ml

100 ml contengono: PRINCIPI ATTIVI: Sorbitolo al 70% non cristallizzabile g 30,00; Dioctilsodiosulfosuccinato g 0,20. ECCIPIENTI: Metile p-idrossibenzoato sodico; Acqua depurata.

Sorbiclis bambini soluzione rettale

100 ml contengono: PRINCIPI ATTIVI: Sorbitolo al 70% non cristallizzabile g 10,00; Dioctilsodiosulfosuccinato g 0,008. ECCIPIENTI: Metile p-idrossibenzoato sodico; Acqua depurata.

## **FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO**

Soluzione rettale.

Flacone 120 ml.

## **CATEGORIA FARMACO-TERAPEUTICA**

Lassativo.

## **TITOLARE AIC**

Laboratorio Farmaceutico SIT S.r.l.

Via Cavour, 70 - 27035 Mede (PV)

## **PRODUTTORE**

Laboratorio Farmaceutico SIT S.r.l.

Via Cavour, 70 - 27035 Mede (PV) (\*)

DMS Farmaceutici S.p.A.

Via Provinciale per Lecco, 78 - 22038 Tavernerio (CO)

(\*) I lotti prodotti da Laboratorio Farmaceutico SIT S.r.l. saranno preceduti dalla lettera S.

## **INDICAZIONI TERAPEUTICHE**

Stitichezza.

## **CONTROINDICAZIONI**

Ipersensibilità verso i componenti del prodotto. Afezioni ano-rettali con lesioni della mucosa.

Ostruzione meccanica delle vie biliari. Insufficienza epatica. Calcolosi biliare.

## **PRECAUZIONI D'IMPIEGO**

Non usare lassativi se sono presenti dolori addominali, nausea e vomito.

## **INTERAZIONI**

Questo prodotto non va usato insieme a paraffina liquida, ad altri medicinali ed a olio minerale o lassativi che lo contengono.

## **AVVERTENZE**

Non usare per trattamenti protratti. Dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili consultare il medico. L'uso continuativo dei lassativi può provocare assuefazione o danno di diverso tipo.

Se la costipazione è ostinata consultare il medico.

In gravidanza o durante l'allattamento usare solo in caso di effettiva necessità sotto il diretto controllo del medico.

TENERE IL MEDICINALE FUORI DALLA VISTA E DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

#### **DOSE MODO E TEMPI DI SOMMINISTRAZIONE**

Tutto il contenuto del flacone per un clistere. Premere a fondo il copricannula in modo da forare la membrana di sigillo.

Non superare le dosi consigliate.

#### **EFFETTI INDESIDERATI**

Il prodotto è ben tollerato. Non sono stati segnalati fenomeni di intolleranza né di fastidio all'applicazione.

Solo nei bambini, occasionalmente, può riscontrarsi transitoria incontinenza con espulsione rapida dell'inoculo.

Nel caso insorgessero effetti indesiderati non descritti nel presente foglio illustrativo rivolgersi al medico o al farmacista.

#### **VALIDITÀ DEL PREPARATO**

**ATTENZIONE:** non utilizzare il medicinale oltre la data di scadenza indicata sulla confezione.

Ultima revisione: Dicembre 2005.