

## Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

### Streptosil con Neomicina 99,5% + 0,5% polvere cutanea Streptosil con Neomicina 2% + 0,5% unguento

Solfatiazolo + Neomicina solfato

**Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo alcuni giorni.

#### **Contenuto di questo foglio:**

1. Che cos'è Streptosil con Neomicina e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Streptosil con Neomicina
3. Come usare Streptosil con Neomicina
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Streptosil con Neomicina
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### **1. Che cos'è Streptosil con Neomicina e a cosa serve**

Streptosil con Neomicina è un medicinale da applicare sulla pelle che contiene neomicina solfato e solfatiazolo.

La neomicina solfato è un antibiotico. Il solfatiazolo è un antibatterico. Sono utilizzati per combattere le infezioni batteriche della pelle.

Questo medicinale è indicato negli adulti e nei bambini per il trattamento delle infezioni superficiali della pelle:

- follicolite (infezione del follicolo pilifero, la struttura che avvolge la radice del pelo);
- foruncolosi (infiammazione della pelle caratterizzata dalla presenza di foruncoli);
- ferite da piccole ustioni;
- ferite infette.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo alcuni giorni.

#### **2. Cosa deve sapere prima di usare Streptosil con Neomicina**

##### **Non usi Streptosil con Neomicina**

- se è allergico al solfatiazolo o alla neomicina solfato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- per le infezioni dell'orecchio.

##### **Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Streptosil con neomicina.

Questo medicinale non è per uso oculare; è indicato solo per uso esterno e non deve essere ingerito.

Non usi Streptosil con Neomicina per un periodo di tempo prolungato o in quantità elevata su superfici estese di pelle, in quanto la neomicina solfato contenuta in questo medicinale, se assorbita,

può causare problemi ai reni, all'orecchio.

Non usi questo medicinale se è in presenza di:

- infezioni secondarie della pelle (infezioni che si sviluppano su lesioni della pelle già presenti);
- estese ustioni;
- ulcere trofiche (lesioni della pelle dovute ad una compromessa circolazione sanguigna);
- condizioni in cui è possibile l'assorbimento di neomicina.

Se utilizza questo prodotto per un periodo di tempo prolungato può dare allergia.

Se utilizza questo medicinale per un periodo prolungato e in modo non appropriato, si potrebbe verificare una crescita eccessiva di batteri o funghi non sensibili e resistenza agli antibiotici, peggiorando la situazione.

Se ciò si verifica è necessario interrompere il trattamento e rivolgersi al medico.

### **Lattanti e bambini**

Usi Streptosil con Neomicina nella prima infanzia solo se necessario, sotto il diretto controllo del medico. Non usi questo medicinale su ampie zone di cute lesa nei lattanti con dermatite da pannolino, poiché il pannolino potrebbe agire come un bendaggio occlusivo e favorire l'assorbimento di neomicina.

### **Altri medicinali e Streptosil con Neomicina**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Non usi altri aminoglicosidi, farmaci analoghi alla neomicina, mentre utilizza questo medicinale, poiché l'uso concomitante potrebbe aumentare il rischio di effetti tossici all'orecchio e ai reni.

### **Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Usi Streptosil con neomicina in gravidanza e in allattamento solo se necessario, sotto diretto controllo medico.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Streptosil con Neomicina non ha effetto sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari.

## **3. Come usare Streptosil con Neomicina**

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

#### *Polvere cutanea*

La dose raccomandata è di 2 applicazioni al giorno. Non superare le dosi consigliate.

Sollevi il cappuccio, prema ritmicamente e a fondo i due lati del flacone tenendolo orizzontalmente o leggermente obliquo; spruzzi leggermente la polvere sulla parte di pelle interessata e copra con una garza sterile. Spruzzi leggermente, utilizzi il minimo indispensabile di polvere per evitare la formazione di croste e permettere una rapida solubilizzazione e diffusione dei componenti.

#### *Unguento*

La dose raccomandata è di un'applicazione 2-3 volte al giorno. Non superare le dosi consigliate.

Applichi una piccola quantità di unguento sulla zona interessata.

### **Se usa più Streptosil con Neomicina di quanto deve**

Non sono stati segnalati sintomi da assunzione di una dose eccessiva di Streptosil con neomicina.

Se pensa di aver usato una dose eccessiva di questo prodotto, sospenda il trattamento e si rivolga al medico o al farmacista.

### **Se dimentica di usare Streptosil con Neomicina**

Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

### **Se interrompe il trattamento con Streptosil con Neomicina**

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

#### **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

La frequenza di tali effetti indesiderati non è nota.

##### Infezioni e infestazioni

Sovrainfezioni batteriche e fungine.

##### Disturbi del sistema immunitario

Reazioni diipersensibilità.

##### Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo

Prurito.

##### Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione

Gonfiore, arrossamento.

#### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa>.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

#### **5. Come conservare Streptosil con Neomicina**

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo Scad. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

#### **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

##### **Cosa contiene Streptosil con Neomicina**

###### *Polvere cutanea*

- i principi attivi sono: solfatiazolo e neomicina solfato;
- gli altri componenti: non sono presenti.

###### *Unguento*

- i principi attivi sono: solfatiazolo e neomicina solfato;
- gli altri componenti sono: olio di vaselina, vaselina bianca, cera bianca.

##### **Descrizione dell'aspetto di Streptosil con Neomicina e contenuto della confezione**

###### **Streptosil con Neomicina 99,5% + 0,5% polvere cutanea**

si presenta in flacone in plastica da 10 g con tappo con foro centrale.

**Streptosil con Neomicina 2% + 0,5% unguento**

si presenta in tubo di alluminio da 20 g.

**Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio**

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH

Bahnhofstr. 1a

17498 Mesekehagen – Germania

**Produttore**

Haupt Pharma Latina S.r.l. – Borgo S. Michele (LT)

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH

Bahnhofstr. 1a

17498 Mesekehagen - Germania

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il**

Agenzia Italiana del Farmaco